

## Atmintinė, vaikų ugdymo įstaigą lankančių vaikų tėvams

Primename, kad Lietuvoje vaikai nuo tymų ir raudonukės skiepijami pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių 15-16,5 mėn. pirmąją kombinuota tymų, epideminio parotito ir raudonukės (MMR) vakcinos doze, o 6-7 metų antrąją MMR doze. Tik įskiepijus dvi MMR vakcinos dozes, pasiekama patikima ilgalaikė apsauga nuo minėtų skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų.

Jei Jūsų vaikas nėra paskiepytas ar nepilnai paskiepytas (tik viena doze) nuo tymų ir raudonukės, jis yra imlus šioms ligoms ir bet kada gali jomis užsikrėsti tiek Lietuvoje, tiek keliaujant - kitose užsienio šalyse.

Visiems nepaskiepytiems, vėluojantiems pasiskiepyti, nepilnai paskiepytiems pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių vaikams dėl tymų ir raudonukės imunoprofilaktikos rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris atsižvelgęs į vaiko amžių, buvusius skiepimus nuo tymų ir raudonukės sudarys individualų skiepavimo nuo šių ligų planą, pagal kurį pasiskiepijus būtų užtikrinta ilgalaikė apsauga.

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams iki 18 m. amžiaus skiepimai nuo užkrečiamųjų ligų pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių yra atliekami Valstybės biudžeto lėšomis.

### Ligos, kurių išvengiama skiepijantis, ir jų keliami rizika sveikatai

|                              | <b>Tymai</b>   | <b>Raudonukė</b>   |
|------------------------------|--|--|
| <b>Apibūdinimas</b>          | Ūmi virusinė liga, kuriai būdingas karščiavimas, makulopapulinis bėrimas sloga, kosulys, akių junginės uždegimas   | Ūmi virusinė liga, kuriai būdingas karščiavimas, makulopapulinis bėrimas   |
| <b>Komplikacijos</b>         | Vidurinės ausies uždegimas, plaučių uždegimas, galvos smegenų uždegimas ir kt.   | Nugaros smegenų dangalų uždegimas, galvos smegenų uždegimas, susirgus nėščiajai – vaisiaus apsigimimas (kurtumas, aklumas ir kt.)                                |
| <b>Sukėlėjas</b>             | Tymų virusas   | Raudonukės virusas   |
| <b>Paplitimas</b>            | Iki visuotinio skiepavimo tymais persirgdavo daugiau nei 90 proc. gyventojų. Šiuo metu registruojami protrūkiai Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir kt. Europos bei pasaulio šalyse. | Prieš visuotinį skiepimą - visame pasaulyje. Šiuo metu dėl plačiai taikomos imunoprofilaktikos reta liga daugelyje Europos šalių, JAV, Kanadoje ir Australijoje. |
| <b>Infekcijos šaltinis</b>   | Sergantis žmogus   | Sergantis žmogus   |
| <b>Perdavimo būdai</b>       | Oro dalelių būdu, esant kontaktui su sergančio žmogaus nosiaryklės išskyromis.   | Oro lašiniu būdu arba per sąlytį su sergančio asmens nosiaryklės išskyromis  |
| <b>Užkrečiamumas</b>         | Ypač užkrečiama liga. 4 d. iki bėrimo ir 4 d. po bėrimo  | Viena savaitė iki išbėrimo – 4 d. nuo bėrimo pradžios.   |
| <b>Imlumas ir imunitetas</b> | Imlūs visi nesirgę, neskiepyti nuo tymų asmenys. Pasiskiepijus, persirgus įgyjamas ilgalaikis imunitetas   | Imlumas visuotinis. Pasiskiepijus, persirgus įgyjamas ilgalaikis imunitetas  |
| <b>Profilaktika</b>          | 15-16 mėn. ir 6-7 m. kombinuota trivalentė tymų epideminio parotito, raudonukės vakcina.   |  |